


Ecologie et dynamique des peuplements forestiers en PACA

Essences dominantes : **diverses : ripisylves**



Etages de végétation

↑ niveau supérieur de l'étage
↓ niveau inférieur de l'étage

- Teinte en aplat = peuplements stables dans la station considérée
- Couleur tramée = peuplements transitoires devant céder la place à ceux caractérisés par les essences indiquées
- semis de points = individus dispersés

Remarques : Saulaies plus ou moins diffuses dans le subalpin Saulaies, populaies, aulnaies à Aulne blanc Aulnaies à Aulne glutineux

La vitalité et la longévité augmentent lorsque les aptitudes à l'enracinement et l'alimentation en eau croissent

Types hydriques de stations				Nutrition minérale	
XX	très xérophytique	M	mésophytique	Sij	Siliceux
X	xérophytique	MH	mésohygrophytique	Dol	Dolomitique
XM	xéromésophytique	HM	hygromésophytique	Cad	Calcaire dur
MX	mésoxérophytique	H	hygrophytique	Caf	Calcaire friable

Chaque case du diagramme peut être assimilée à un grand type de station susceptible d'être subdivisé en variantes. Chaque peuplement forestier est ainsi caractérisé par son thermo-édaphogramme et son degré de stabilité dynamique, dans l'hypothèse de l'abandon des influences humaines et en l'absence de fréquents cataclysmes ou perturbations d'origine naturelle.