


Frêne oxyphylle

Fraxinus angustifolia Vahl

N° 273815

- Placettes avec présence de l'espèce :
240 sur 9695 placettes IFN (2,50 %).



Distribution géographique diffuse et à altitude relativement basse. Ce Frêne est surtout représenté dans les stades pionniers.

Dans les stations hygromésophytiques à la couverture herbacée, il peut se comporter comme un post-pionnier.

Source : Base de données floristique de l'Inventaire Forestier National et observations personnelles du Pr Guy Aubert

CARACTÈRES BIOLOGIQUES

- arbre de 20-25 m ; méso-macrophanérophyte - caducifoliée ;
- longévité 150-200 ans ; rejette de souche ;
- Polygame ; floraison : mars à mai, avant la feuillaison ; pollinisée et dispersée par le vent ;
- postpionnière, nomade.

CARACTÈRES DIAGNOSTIQUES

- tronc court (par rapport à *F. excelsior*), souvent flexueux
- houppier léger ;
- écorce âgée grisâtre, profondément fissurée et écailleuse ;
- bourgeons bruns ;
- feuilles opposées, composées, pennées, à 3-11 folioles lancéolées, étroites, à dents espacées recourbées vers l'extérieur ;
- samares longues de 20-45 mm, plus petites que chez *F. excelsior* et mûrs plus tôt, à extrémité rostrée ; graine dépassant le milieu du fruit.

